



Laryngoscope 1997;107:187-191

EPLEYs MANØVRE VED VENSTRESIDIG BPPV

1.		Hovedet drejes 45° mod venstre. Bliver i stillingen i 3 min.
2. 105°		Med en 105° bevægelse bagud lægges patienten på ryggen
3. 90°		Hovedet drejes 90° mod højre
4. 90°		Hovedet og kroppen drejes yderligere 90° mod højre Bliver i stillingen i 3 min.
5. 105°		Tilbage til siddende stilling

Dix-Hallpikes manøvre



hovedet bevæges i højre posteriore buegangs plan
manøvren medfører nystagmus og svimmelhed

Kommentar:

Ovenstående illustrationer viser Dix-Hallpikes manøvre - hvis nogen skulle have glemt teknikken. Min egen primitive tegning af Epley-manøvren, hænger jeg altid op på væggen bag patienten, når jeg tryller proppen i posteriore buegang ud i vestibulum, hvor den ikke gør skade. Dix-Hallpikes manøvre er på tegningen vist, som den skal foretages ved undersøgelse af sygdom i højre posteriore buegang. Epleys manøvre er på tegningen demonstreret, som den skal foretages, når Dix-Hallpikes er positiv for venstre posteriore buegang. Når det er højre posteriore buegang, der er syg, er manøvren naturligvis spejlvendt i forhold til den demonstrerede. (SV)